



*Partez à la  
découverte de  
quelques espèces...*






# Balbusard pêcheur

*Pandion haliaetus*



Le Balbusard pêcheur est un rapace diurne, plus grand que la buse, aux ailes longues et assez étroites. Il montre un fort contraste entre les parties supérieures d'un brun foncé et le dessous du corps blanc, typique lui aussi. Les poignets noirs ressortent bien sur fond clair.

## Alimentation



## Milieu de vie



Sa tête est blanche, barrée de noir au niveau de l'œil à iris jaune. Compte tenu de son alimentation piscivore, le balbusard a besoin de milieux aquatiques riches en poissons toute l'année. De plus, l'habitat doit comporter des conditions favorables à la nidification.



# Martin pêcheur

Alcedo atthis



Le Martin pêcheur est un oiseau de la famille des Alcédinidés. Son alimentation se composant de petits poissons et animaux aquatiques, il passe le plus clair de son temps aux abords des étendues et cours d'eau. On peut l'observer perché près de l'eau, avant d'y plonger pour attraper sa proie.

Alimentation



Milieu de vie



Lors de la période de nidification, il creuse un terrier dans lequel naissent les petits. A tour de rôle, le mâle et la femelle couvent les œufs. Dès leur premier envol, les jeunes partent pour s'installer sur un nouveau territoire.



# Chouette effraie

*Tyto alba*



L'Effraie des clochers est un rapace nocturne facilement reconnaissable. L'espèce possède ce nom en référence à son cri emblématique (que nous vous invitons à écouter sur la sonothèque du MNHN).

## Alimentation



## Milieu de vie



Il s'agit d'un rapace de taille moyenne au masque facial blanc en forme de coeur. Elle vit souvent proche de l'Homme et on ignore souvent sa présence car elle passe le jour dans des endroits très retirés et calmes. Parmi ceux-ci, les clochers d'églises.




# Orite à longue queue

*Aegithalos caudatus*



Anciennement nommée Mésange à longue queue, l'Orite à longue queue est un tout petit passereau reconnaissable par une très longue queue noire et blanche (6-10cm). Rarement observée seule, les individus passent l'essentiel de leur vie au sein d'un groupe familial.

## Alimentation



## Milieu de vie



On la retrouve dans les boisements mixtes de feuillus et de conifères, mais aussi dans les parcs et les jardins. Elle se nourrit d'insectes, de leurs œufs et de larves.



# Orme lisse

*Ulmus laevis*



Floraison

Mars - Avril

Milieu de vie



L'Orme Lisse est l'une des trois espèces d'Orme de France, la plus rare et la plus dispersée. L'espèce est emblématique des forêts alluviales et des grandes vallées. Il reste cependant très largement méconnu, tant du fait de sa rareté relative que de la difficulté à le différencier de ses deux proches cousins, bien plus communs, tant qu'on ne dispose pas de ses fruits, visibles seulement sur une période assez courte.

Il est cependant possible de l'identifier grâce à quelques indices :

- Des touffes très fournies de gourmands (rejets) couvrent souvent les premiers mètres du tronc.
- Présence de hauts contreforts qui rayonnent à la base du tronc.





# Orme lisse

*Ulmus laevis*



L'Orme Lisse est l'une des trois espèces d'Orme de France, la plus rare et la plus dispersée. L'espèce est emblématique des forêts alluviales et des grandes vallées.

Il reste cependant très largement méconnu, tant du fait de sa rareté relative que de la difficulté à le différencier de ses deux proches cousins, bien plus communs, tant qu'on ne dispose pas de ses fruits, visibles seulement sur une période assez courte.







Il est cependant possible de l'identifier grâce à quelques indices :

- Des touffes très fourmies de gourmands (rejets) couvrent souvent les premiers mètres du tronc.
- Présence de hauts contreforts qui rayonnent à la base du tronc.



# Epeire frelon

Argiope bruennichi



L'espèce possède une couleur caractéristique avec son abdomen rayé transversalement de jaune et de noir. La toile est signée par un dessin vertical en zigzag et est généralement tissée assez bas dans la végétation, dans des milieux ensoleillés et moyennement humides : friches, pelouses, landes mésophiles et humides.

## Alimentation



## Milieu de vie



Les mâles sont présents en juillet-août et les femelles d'août à octobre. La femelle peut pondre deux cocons de forme caractéristique (montgolfière renversée). Le cocon sera ensuite abandonné dans la végétation.




# Crapaud Calamite

*Epidaleia calamita*




De manière générale le crapaud calamite a un aspect trapu. De profil, son museau est court. La pupille est ovale horizontale avec un iris jaune vif. Son dos est traversé d'une ligne médiodorsale jaune pâle. Il est spécialiste des plans d'eau pionniers.

## Alimentation



## Milieu de vie



Il résiste aux sécheresses subites grâce à une longue période de reproduction qui s'étend d'avril à septembre, un nombre élevé d'œufs et une vitesse rapide de développement des larves.




# Triton alpestre

## Ichthyosaura alpestris

On reconnaît ce triton à son dos généralement de couleur gris-bleu ainsi qu'à son ventre et sa gorge orange sans taches. D'une taille de 8 à 9 cm pour les mâles et de 13 cm pour la femelle, il possède des pattes courtes non palmées ainsi qu'une queue aplatie latéralement.



### Alimentation



### Milieu de vie



Entre la mi-février et mai, les adultes migrent vers les sites de reproduction. Il privilégie les eaux stagnantes, mais peut aussi se retrouver dans les anses calmes et les cuvettes des cours d'eau.



# L'Aurore

*Anthocharis cardamines*



Ce lépidoptère appartient à la famille des Piérides. Le mâle se reconnaît aux belles tâches oranges sur ses ailes supérieures. La femelle, elle, n'en a pas. Cette différence d'aspect entre le mâle et la femelle s'appelle le dimorphisme sexuel. Parmi les premiers papillons à revenir, dès la fin mars, l'aurore annonce le retour du printemps.

**Alimentation**



**Milieu de vie**



On le retrouve dans les milieux propices à la présence de ces plantes hôtes, comme la cardamine des près et l'aliaire.






## Lézard à deux raies *Lacerta bilineata*



Tout comme son proche cousin *Lacerta viridis*, ce lézard a une teinte verte mouchetée de noir avec un ventre vert/jaune vif, sans taches. Il s'agit d'un grand lézard, mesurant en moyenne 30 cm de longueur totale. Le dimorphisme sexuel est marqué.

### Alimentation



### Milieu de vie



En effet les mâles possèdent une coloration bleu vif sur la gorge et les côtés de la tête durant la reproduction. Cette coloration peut aussi être présente chez les femelles en moins intense.



# Le Dorcadion fuligineux

## Iberodorcadion fuliginator



Iberdorcadion fuliginator est un coléoptère atypique de par sa forme trapue et ses élytres bruns ou gris striés de lignes claires. Bien que principalement présent dans le sud de la France métropolitaine, il est possible d'en rencontrer en Île-de-France.

### Alimentation



### Milieu de vie



Les plantes hôtes des larves du Dorcadion fuligineux sont les graminées. Les adultes éclosent en juillet-août puis passent l'hiver dans le sol avant de sortir à nouveau au printemps.



## Le Buse variable

### Buteo buteo



La Buse variable tient son nom de son plumage extrêmement variable. Il peut aller d'un blanc presque pur à un brun sombre, quasi uniforme, avec tous les intermédiaires possibles et imaginables. En vol, elle possède une silhouette massive et trapue.

#### Alimentation



#### Milieu de vie



La Buse variable est avant tout un oiseau forestier. Il a besoin des arbres pour la nidification. Mais plutôt que la forêt compacte, il apprécie les marges des zones forestières, les écotones, etc...



## Le criquet ensanglanté

### *Stethophyma grossum*




Le Criquet ensanglanté est de couleur kaki clair brillant avec des motifs noirs et rouge le long des fémurs. Ses tibias sont jaunes et possède un anneau noir vers l'extrémité. Le nom "ensanglanté" vient de la présence fréquente de taches pourpres sur les femelles.

#### Alimentation



#### Milieu de vie



Il fréquente les endroits humides tel que les prairies hygrophiles et les biotopes riverains. L'espèce a beaucoup décliné durant les dernières décennies, victime du drainage, de l'assèchement et de la destruction de ses écosystèmes semi-aquatique.





*Continuez à rester curieux de nature !  
L'équipe de l'ANVL vous remercie.*

